

Halálosan mérgező gombák

Készítsen egy szórólapot néhány halálosan mérgező gombafajtról! A feladat nyers szövegét a mellékelt *halalos.txt* fájlban találja. Munkáját mentse szövegszerkesztője formátumában, *halalos* néven! A feladatban Times New Roman vagy Nimbus Roman, illetve Arial vagy Nimbus Sans betűtípusokat használjon! A megoldás során kövesse a mintát!

1. A szórólap A4-es méretű, minden oldalán 2 cm-es margóval. A lapot szegélyezze figyelemfelkeltő, piros oldalszegéllyel!
2. A lap tetején alakítson ki egy táblázatot a minta alapján! A táblázat magassága 3 cm, az első és az utolsó oszlop szélessége 4 cm. Szegélye 2-3 pont vastag, folyamatos vonal, mintázata a (255;229;229) RGB színkódú világospiros. A táblázatban nincsenek cellamargók.
3. Az első és a harmadik cellába illessze be a mellékelt *halai fej.png* képet, majd méretezze át azokat arányosan 3 cm szélesre!
4. A középső cellában alakítsa ki a címet piros színnel, 25 pontos, félkövér betűvel! Állítson be ritkítást és csökkentse a sorközt!
5. A táblázat alá, jobbra igazítva készítse el a forráshivatkozást! Szúrja be a mellékelt *gombanet.png* képet, és alakítsa a szövegfájlban lévő címre mutató hiperhivatkozássá! A kép magasságát állítsa arányosan 12 pontosra!
6. Készítse el a négy gombát ismertető táblázatot a következő leírás és a minta alapján!
7. A táblázat mintázata megegyezik a felső táblázatéval, szegélye vékony, piros vonal. Állítson be 0,1 cm-es cellamargókat!
8. A bal oldali cellákban helyezze el a gombák képeit! A képek fájlneve megegyezik a gombák latin nevével, *jpg* formátumban. A képek szélességét állítsa be arányosan 5 cm-re! A gombák magyar neve félkövér, latin neve dőlt.
9. A jobb oldali cellákba másolja be a gombák leírását! A leírás legyen 8 pontos, sorkizárt. A szempontokat állítsa félkövérré!



Halálosan mérgező gombák



Forrás: www.mta.hu



Fehér galóca
(*Amanita verna*)

Kalap: Főgömb alakból domború, majd kiterülő, kb. 5-8 cm széles. Kezdetben hófehér színű, később a közepén lehet kissé sárgás. Ragadós vagy szárazon fényes. Pereme néha pehelyes. Bőre lehúzható.

Lemezok: Sűrűn állók, nem lefutók, a kalap szélén szélesebbek, fehérek. Spórák fehérek, gombódyedek. Spórapora fehér.

Tönk: Karcsú, 8-15 cm hosszú, 0,5-2 cm vastag, tömör, később esetleg odvasodó. Színe fehér. Gallérija lefűgő. A tönk alján a gumón fejtett bocskor van, amely nem ritkán a tönkre tapad. A bocskor a tönk gumós tövével együtt mélyen az avarba süllyed, és könnyen beleszakad.

Hús: Fehér, eléggé puha, vízenyős, hamar romlik.

Szag és íz: Szaga többnyire jelentéktelen, olykor a gyilkos galócához hasonló. Az idősebb példányok íze lehet kissé csípős, kaparó.

Termőhely és idő: Nedvesebb meszes talajú erdőkben termő gyökérgapocsit gomba, amely inkább a melegbb vidéken fordul elő. Főleg földgyek alatt, egyesével vagy néhány példány együtt nő. Már májusban előjöhethet és októberig előfordul.



Fenyves turjángomba
(*Galerina marginata*)

Kalap: 1-6 cm átmérőjű; kezdetben kúpos, domború, majd kiterülő, okkersárga, sárgásbarna, fahéjbarna, nedvesen sötétebb, kiszáradva fakóokkeres színű; felülete sima, pereme áttetszően bordás.

Lemezok: A tönkhöz nőttek, esetleg kissé lefutók, sűrűn állók; először okkeresek, később fahéjbarnák.

Tönk: 2-8 cm hosszú, 0,3-0,8 cm vastag; hengeres, gyakran görbe; üreges; felül világosbarna, lefelé rozsdabarna; felületét fehéres szálcáskák borítják; gallérija vékony, többé-kevésbé molekány, barnás színű.

Hús: Vékony, a kalapban sárgásbarna, a tönkben barna; gyengén liszt szagú és ízű.

Spórapor: Rozsdabarna.

Előfordulás: Szeptembertől novemberig, fenyőfűszűkben, ritkábban lombos fakorhadékán, egyenként vagy kis csoportban növő, nem gyakori faj.



Gyilkos galóca
(*Amanita phalloides*)

Kalap: 5-15 cm átmérőjű; domború, majd ellaposodik; oliv-, sárgás-, barnászöldes, de lehet fehéres is; gyakran benőttten szálas, csak ritkán van rajta fehéres burokmaradvány.

Lemezok: Sűrűn és szabadon állók, szélesek, fehérek.

Tönk: 7-20 cm hosszú, 1-2,5 cm vastag; hengeres; fehéres, gyakran zűdésen márványozott felületű; lefűgő, fehér gallérija és a gumós tövén bő, elálló szélű, fehér bocskora van.

Hús: Puha, vízenyős; fehér; édeskés szagú, jó ízű, ne kóstoljuk!

Spórapor: Fehér.

Előfordulás: Júniustól novemberig, lomberdőben, főleg földgy alatt, ritkán fenyvesben növő, gyakori faj.



Hűsbarnás özlábgomba
(*Lepiota brunneo-incanata*)

Kalap: 2-4 cm átmérőjű; púpos, harang alakú, majd ellaposodik; közepén kissé púpos marad; széle gyakran hullámos, behasadtzó; fehéres alapszínű felületén bíborbarnás, hűsbarnás, többnyire körkörösén elhelyezkedő pikkelyek vannak, közepén sötétebb, egyszínű, bíborbarnás, sima.

Lemezok: Sűrűn és szabadon állók, szélesek, fehérek, bíborvörösén foltosodhatnak.

Tönk: 2-4 cm hosszú, 0,3-0,5 cm vastag; hengeres; fehéres, lefelé hűsvörösés, a gallérizána alatt hűsbarnás, bíbor-szürkésbarna övekkel díszített.

Hús: Vékony, puha, törékeny; fehéres, a tönkben kissé hűsvörösés színű; gyenge gyömszűkítő, íze nem jellegzetes.

Spórapor: Fehér.

Előfordulás: Májustól októberig, többnyire homokos talajú lomberdőben, erdőszélén, út mellett növő, nem ritka faj.